

Bitte lesen Sie vor Anwendung die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum Nachlesen auf.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Was ist eine Harnwegsinfektion?

Harnwegsinfektionen (engl. Urinary Tract Infections - UTI) stellen jedes Jahr bei Millionen Menschen ein gesundheitliches Problem dar. Frauen sind dabei 50-mal häufiger als Männer betroffen.

Fast die Hälfte aller Frauen erkranken einmal in ihrem Leben an einer UTI, und ca. 20% der Frauen haben wiederkehrende Harnwegsinfekte. Die mit einem Harnwegsinfekt assoziierten Risikofaktoren sind dabei: Geschlechtsverkehr, Diabetes mellitus, das Tragen von Kathetern, Schwangerschaft, Einnahme von Antibiotika, die Menopause sowie ein früherer Harnwegsinfekt.

Die mit einer UTI assoziierten Symptome sind Schmerzen beim Wasserlassen, vermehrtes Wasserlassen, trüber Urin sowie Blutbeimengungen im Urin. Im letzteren Falle sprechen Sie bitte sofort mit Ihrem Arzt.

Was ist die Ursache einer Harnwegsinfektion?

Escherichia coli-Bakterien verursachen fast 80% aller Harnwegsinfektionen, andere mit Harnwegsinfektionen assoziierte Bakterien sind Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella, Enterobacter und Proteus-Stämme.

Welche Wirkung hat CyVision®?

Mit CyVision® kann ein Harnwegsinfekt sowohl behandelt als auch verhindert werden. CyVision® stört dabei die Anhaftung (Adhäsion) der die UTI verursachenden Bakterien. UTI-Active™ ist der aktive Wirkstoff von CyVision® und verhindert die Adhäsion der Bakterien in den Harnwegen. Hierdurch wird der Ausbruch eines Harnwegsinfekts verhindert bzw. im Falle eines Infekts die Vermehrung der pathogenen Keime inhibiert. Dies führt zu einer Linderung der mit der UTI assoziierten Symptomatik.

CyVision® ist für die Behandlung bzw. Prophylaxe von Harnwegsinfekten angezeigt. CyVision® enthält ein patentierten hochkonzentrierten Extrakt aus ganzen Cranberries (UTI-Active™)

Zur Behandlung einer Harnwegsinfektion nehmen Sie zwei Kapseln täglich mit einem Glas Wasser für den Zeitraum von 15 Tagen ein.

Zur Prophylaxe einer Harnwegsinfektion nehmen Sie eine Kapsel täglich mit einem Glas Wasser ein.

Bitte nehmen Sie CyVision® nicht ein, wenn Sie überempfindlich bzw. allergisch gegen Beeren der Gattung Vaccinium sind (Cranberries, Heidelbeeren, usw.).

Bitte nehmen Sie CyVision® nicht nach dem Verfallsdatum ein. Dieses ist auf dem Karton und dem Blister aufgedruckt.

Wenn sich die Symptome des Harnwegsinfekts nicht innerhalb von 5 Tagen nach Beginn der CyVision®-Einnahme verbessern, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Wenn sich die Symptomatik des Harnwegsinfekts verschlimmert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

CyVision® für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nur für die orale Einnahme geeignet.

Vorsichtsmaßnahmen

Soweit bekannt, kann CyVision® problemlos während der Schwangerschaft bzw. in der Stillzeit eingenommen werden, sofern die Angaben in der Gebrauchsanleitung bzw. die empfohlene Dosierung eingehalten werden. Bitte konsultieren Sie auf jeden Fall Ihren behandelnden Arzt bei einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit.

Falls Sie Warfarin anwenden, sollten Sie vor Einnahme von CyVision® Ihren Arzt befragen.

Soweit bekannt, kann CyVision® ansonsten zusammen mit anderen Wirkstoffen eingenommen werden. Bei Unklarheiten oder Zweifeln konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Soweit bekannt, kann CyVision® ohne Sicherheitsbedenken bei Kindern von über 12 Jahren eingenommen werden.

Soweit bekannt, können Diabetiker CyVision® ohne Sicherheitsbedenken einnehmen.

Nebenwirkungen

keine bekannten Nebenwirkungen

Packungsinhalt

Blisterpackung mit
30 CyVision®-Kapseln
Gebrauchsanleitung

Lagerung

Lagern Sie CyVision® bei Raumtemperatur (15° - 25° C) an einem sicheren, trockenen und dunklen Platz.

Bitte nehmen Sie CyVision® nicht nach dem Verfallsdatum ein. Dieses ist auf dem Karton und dem Blister aufgedruckt.

Inhaltsstoffe

UTI-Active™, Amylum solani, Hydroxypropylmethylcellulose (100% HPMC), Titandioxid. UTI-Active™ ist ein patentierter Extrakt (Konzentrat) aus Cranberries.

Hersteller

Medical Brands
Innovations B.V.
Piet Heinkade 199
1019 HC Amsterdam
Niederlande

Vertrieb

Uropharm AG
Erfurtstrasse 64
53125 Bonn
Deutschland
www.uropharm.de

Stand der Information

Diese Gebrauchsanleitung wurde zuletzt im Juni 2015 überarbeitet.

Information / Bestellung:

0228 - 38758730
www.cy-vision.de